

Дегельмінтизація коней

Антіпов А.А.,
Головаха І.В.,
Білоцерківський
НАУ

Мігрують і шкодять

У коней зареєстровано понад 90 видів гельмінтів, з яких найбільш чисельною групою є нематоди кишечника. Найбільшою шкоди завдають мігруючі личинки параскарид та стронгілід. Особливо тяжко хворіють лошата першого року життя.

Гельмінтози спричинюють зниження працездатності коней і втрату їх племінних якостей. Першочерговим завданням ветеринарних паразитологів є профілактика гельмінтозів у лошат.

Висока ураженість коней гельмінтами — одна з найактуальніших проблем, що стримує розвиток галузі конярства в Україні. Основний метод боротьби із цими хворобами — використання антигельмінтних препаратів.

Для боротьби з кишковими нематодозами у коней розроблено цілий арсенал ефективних хімічних препаратів — бензімідазоли, піримідини, тетрамізоли, антибіотики аверсектинового ряду тощо. Однак нерациональне, тривале і безконтрольне використання антигельмінтиків призвело до розвитку резистентних рас нематод. **Безсистемні «сліпі» протипаразитарні обробки без визначення класу збудників, інтенсивності та екстенсивності інвазії, недотримання інтервалів між обробками призводять до зниження їх ефективності.**

У ветеринарній медицині досить широко застосовують антигельмінтики вітчизняного і закордонного виробництва: бровадазол 20 % у дозі за параскарозу 0,75 г/10 кг маси тіла, за стронгілятозів — 0,5 та стронгілоїдозу — 0,4 г/10 кг

маси тіла; бровадазол плюс за змішаної інвазії (параскароз, оксіуроз, стронгілятози та стронгілоїдоз) у дозі 1,5–2 г/10 кг маси тіла одноразово; бровальзен порошок у дозі 0,7 г/10 кг м.т. (при змішаних нематодозах) одноразово. Перед застосуванням антигельмінтик змішують з кормом і дають під час ранкової годівлі.

Бровадазол гель, бровермектин гель, гельмісан, івермікол гель для лікування та профілактики застосовують одноразово перорально у дозі 1 мл/20 кг м.т.; івермектин 1,87 % пасту в дозі 0,2 мг діючої речовини на 1 кг м.т. або шприц-тубу (6,42 г) для коня масою тіла 600 кг; алезан — 1 г/100 кг м.т.; еквест 2 % при використанні каліброваного аплікатора (шприц з дозатором) — 1 позначка шприца на 25 кг м.т. або один шприц коневі з масою тіла 545 кг.

З метою профілактики нематодозної інвазії лошат поточного року народження вперше дегельмінтизують у серпні-вересні, вдруге — у листопаді-грудні, молодняк віком від 1 до 2 років і дорослих коней — відповідно в березні-квітні та жовтні-листопаді. Лошат краще обробляти з 4-місячного віку. У неблагополучних по нематодозах господарствах дорослих коней дегельмінтизують один раз у 3 місяці з обов'язковою обробкою перед виходом на пасовища і після постановки в денники. **ЗТ**

Безпечні ліки для найменших

В'ячеслав
Коптєв,
лікар
ветеринарної
медицини


Звідки небезпека

Маленькі лошата їдять випорожнення нобил, бо в калі дорослого коня знаходиться велика кількість бактеріальної флори, яка необхідна для нормального розвитку молодого кишківника. Головний ризик — зараження яйцями паразитів.

При ураженні глистами зовнішній вигляд лошати стає дуже специфічним: воно втрачає вагу, постійно треться об стіни денника хвостом, шерсть набуває матового відтінку, в череві чути гучне бурчання.

Екстенсивність інвазії коней нематодами родини Strongylidae майже стовідсоткова, до 100% молодняку коней заражено параскарозом. Більшість антгельмінтиків не рекомендують застосовувати для лікування лошат віком до 6–12 місяців у зв'язку з високою токсичністю та імунодепресивними властивостями.

Найбезпечніші антгельмінтики для лошат — на основі аверсектину С. Антгельмінтний препарат **Немасектин паста для коней для перорального застосування** має широкий спектр дії для лікування і профілактики паразитозів у ранньому віці, які викликаються шлунково-кишковими та легеневиими нематодами, мікрофіліаріями, личинками овоїдів. Спектр протипаразитарної дії поширюється на представників трьох найпоширеніших



класів паразитів Nematoda, Insecta, Arachnoidea. Застосовують індивідуально перорально, одноразово в дозі 2 г/100 кг м.т. Враховуючи низьку токсичність пасту немасектин, її можна застосовувати лошатам з двотижневого віку при високих ризиках інвазії. Перевагою препарату є чітко дозоване пероральне введення, що особливо важливо в перший рік життя лошати. **ЗТ**