

УДК 619:636.34:612.017.1

МОСТОВАЯ А.В., магистрант

Научный руководитель **ГОЛОВАХА В.И.**, д-р вет. наук, профессор
Белоцерковский национальный аграрный университет,
г. Белая Церковь, Украина

ЛЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У СОБАК

В настоящее время в ветеринарной медицине все острее проблема с аллергическими реакциями у животных. Чаще всего у животных – атопический дерматит, который проявляется сыпью и сильным зудом.

По данным ветеринарной клиники «Оленятко» (г. Херсон), атопическим дерматитом болеет 38% собак из поступивших в лечебный центр с кожной патологией. Наиболее чаще заболевание проявлялось у шарпеев, мопсов, французских бульдогов, лабрадоров и их помесей.

Существует много методик лечения атопического дерматита, но не всегда они эффективны. Поэтому актуальность работы заключалась в разработке эффективной схемы лечения этой патологии.

Схема лечения избиралась индивидуально по многим показателям. Для проведения исследовательской работы было отобрано две группы собак по 10 животных в каждой. Для исключения блошиного дерматита и пищевой аллергии были проведены регулярные обработки от блох и исключающая диета.

Первой группе животных применяли: *преднизолон* (для контроля зуда и аллергической реакции) перорально в дозе 0,5–1 мг на кг массы тела. Наружно применяли в течение 10 дней ежедневно мазь «*Санодерм*». Схему применения преднизолона подбирали индивидуально, не менее двух недель с дальнейшим снижением дозы. Некоторым животным преднизолон применяли 3 месяца с дальнейшим переходом на схему через день. Эффективность лечения при этой схеме начала проявляться на третий день: уменьшение зуда, отечности, однако у некоторых собак проявились полиурия и полидипсия.

Второй группе применяли следующую схему: негормональный препарат – *апоквель* (действующее вещество *олацитиниб*) перорально, в дозе 0,4–0,6 мг/кг массы тела. Наружно использовали крем-эмульсию «*Дог-экзема*» (*неомицин*, *цинка оксид*, *сульфирам*, *преднизолон*) в течении 10 дней. В первый же день лечения у животных исчез зуд, уменьшилась воспалительная реакция кожи. Зачастую *апоквель* давали дважды в день длительный период (в течение 3 месяцев). У данного препарата не было отмечено побочных явлений.

Таким образом, проведенные исследования показали, что вылечить собак с атопическим дерматитом практически очень сложно, а зачастую - невозможно. Поэтому лечение должно быть направлено на улучшение общего состояния и статуса кожи, шерстного покрова. При применении *апоквела* ремиссия в 60% случаев наступала через 3 месяца, а при применении *преднизолона* (в 30% случаев) - через 6 месяцев.