

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВСП «КОМПАНІЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ЕПІЗООТОЛОГІЯ З МІКРОБІОЛОГІЄЮ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
для контролю знань студентів
з розділу “Інфекційні хвороби свиней”
Методична розробка



2025 р.

Укладач: Олена КОНДРАТЮК, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Епізоотологія з мікробіологією», Відокремленого структурного підрозділу «Компаніївський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ».

Рецензент: Валентина ГОРДІЄНКО, викладач вищої кваліфікаційної категорії, методист, голова циклової комісії ветеринарних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу «Компаніївський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ».

Тестові завдання розроблені для проведення заміру контролю знань та проведення самоконтролю у здобувачів освіти з навчальної дисципліни «Епізоотологія з мікробіологією», зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», з розділу «Хвороби свиней».

Рекомендовано цикловою комісією ветеринарних дисциплін ВСП «Компаніївський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ», протокол №4 від 12.11.2024 р. для використання в освітньому процесі.

ЗМІСТ

1. Передмова	2
2. Тестові завдання	3
Чума свиней.....	3
Африканська чума свиней.....	5
Вірусний гастроентерит свиней.....	7
Бешиха свиней	9
Гемофільний полісерозит.....	11
Ензоотичний енцефаломієліт.....	12
Дизентерія свиней.....	14
Інфекційний атрофічний риніт.....	17
3. Ключ визначення правильності відповідей.....	19
4. Література	20

Передмова

Згідно з принципами навчального процесу для виключення впливу фактора під час оцінювання знань та умінь здобувачів освіти пропонується тестовий контроль.

Конкретно складені тестові завдання, чітко сформовані правила складання відповіді на них допоможуть максимально повно й об'єктивно визначити рівень знань засвоєння дисципліни та сформованості певних певних компетентностей професійних умінь, необхідних для виконання тих чи інших виробничих і типових завдань діяльності.

Тестові завдання з дисципліни “Епізоотологія з мікробіологією” розроблені згідно навчальної програми з дисципліни.

Тестові завдання можна використовувати після вивчення окремих тем та при вивченні цілого розділу – “Хвороби свиней”.

Для повного всебічного та об'єктивного рівня знань рекомендується здійснювати підбір не менше 15 текстових завдань із різних тем пропорційно їх важливості та кількості навчального часу, відведеного для їх вивчення. Для об'єктивного та швидкого визначення правильності відповідей, рекомендується для викладача правильності відповідей на тестові завдання.

Для самоконтролю рівня знань у роботі після тестів подано правильні відповіді на всі завдання.

Рівень знань студентів пропонується визначити за формулою:

$$PЗ = \frac{\Sigma_{пв} - \Sigma_{нв}}{\Sigma_{пв} + \Sigma_{нв}} * 100$$

де РЗ – рівень знань;

$\Sigma_{пв}$ – кількість правильних відповідей

$\Sigma_{нв}$ – кількість неправильних відповідей

Якщо студент дав 41-60% правильних відповідей на тестові завдання то рівень його знань оцінюється як “задовільний”, 61-80% – “добрий”, 81-100% – “відмінний”.

Тема: Інфекційні хвороби свиней***Чума свиней***

1. Які інші назви хвороби „чума свиней” Вам відомі?
 1. класична чума свиней
 2. європейська чума свиней
 3. азіатська чума свиней
 4. німецька чума свиней
 5. паризька хвороба свиней
2. Якими клінічними ознаками характеризується чума свиней?
 1. підвищення температури тіла
 2. гнійний риніт
 3. поліартрит
 4. почервоніння шкіри вух, стегон, живота
3. До якої групи хвороб за збудником належить чума свиней?
 1. рикетсіози
 2. хламідіози
 3. бактеріози
 4. вірози
 5. мікози
4. Чи може збудник чуми свиней утворювати капсули?
 1. може
 2. не може
 3. можуть окремі штами
5. Вкажіть на тропізм збудника чуми свиней?
 1. пантропний
 2. міотропний
 3. епітеліотропний
 4. нейротропний
 5. гемотропний
6. Які види лабораторних тварин чутливі до збудника чуми свиней?
 1. білі миші
 2. пацюки
 3. морські свинки
 4. кроленята віком 14 діб
 5. немає правильної відповіді
7. Назвіть можливі шляхи зараження тварин збудником чуми свиней
 1. аліментарний
 2. аерогенний
 3. трансоваріальний
 4. трансмісивний
8. Чи має місце вірусоносійство після перехворювання свиней чумою?
 1. вірусоносійство триває до 10 місяців після перехворювання
 2. вірусоносійство при чумі свиней не спостерігається
 3. вірусоносійство припиняється через 5-7 днів після зникнення

4. клінічних ознак
 5. вірусоносійство може бути тільки при ускладненні бактеріальною інфекцією
9. Назвіть можливі форми перебігу чуми свиней?
1. гостра
 2. надгостра
 3. атипова
 4. хронічна
10. Якими клінічними ознаками характеризується чума свиней за гострого перебігу?
1. явищами септицемії
 2. гнійним ринітом
 3. фібринозним поліартритом
 4. геморагічним діатезом
11. Якими клінічними ознаками характеризується чума свиней за хронічного перебігу?
1. крупозною пневмонією
 2. гепатитом
 3. метритом і вагінітом
 4. крупозно-дифтеритичним колітом
12. Назвіть найбільш характерні для чуми свиней патологоанатомічні зміни?
1. плямисті крововиливи на слизових оболонках гортані
 2. некрози печінки
 3. набряки повік
 4. інфаркти в селезінці у вигляді чорно-червоних бугорків
 5. кропивний висип
13. Якими інфекціями може ускладнюватися класична чума свиней?
1. туберкульоз
 2. лейкоз
 3. пастерельоз
 4. сальмонельоз
 5. бешиха
14. Які лікарські засоби можна використовувати для лікування хворих на чуму свиней?
1. проносні
 2. в'яжучі
 3. дезінфікуючі
 4. сечогінні
 5. відхаркувальні
 6. лікування не розроблене
15. Що роблять із хворими на чуму свинями?
1. ізолюють, а потім забивають на м'ясо
 2. тварин забивають, а туші спалюють
 3. ізолюють і лікують симптоматичними засобами
 4. ізолюють і лікують сироваткою реконвалесцентів

16. Що роблять із тушами при забої хворих на чуму свиней?

1. внутрішні органи утилізують, а м'ясо використовують без обмежень
2. туші разом із шкірою і внутрішніми органами утилізують
3. м'ясо на копченості, а внутрішні органи на промпереробку
4. м'ясо разом із внутрішніми органами використовують на варені ковбаси або консерви .

17. Яка тривалість імунітету до повторного захворювання в перехворілих на чуму свиней?

1. до 6 місяців
2. до 1 року
3. пожиттєвий імунітет
4. імунітет відсутній

18. Чи існує специфічна профілактика чуми свиней в Україні?

1. існує за допомогою сироваток реконвасцентів
2. існує за допомогою гіперімунних сироваток
3. існує вакцина ЛТ-1
4. існує вірус вакцина зі штаму К
5. існує вакцина ВР-2 тільки для свиней

19. Через який час знімають карантин із неблагополучного щодо чуми свиней господарства?

1. через 12 місяців після першого випадку прояву захворювання
2. через 40 днів після останнього випадку загибелі або забою хворих
3. тварин
4. Зчерез 2 місяці після останнього випадку загибелі або забою хворих
5. тварин
6. 4при чумі свиней карантин на господарство не накладається

Африканська чума свиней

20. До якої групи хвороб за збудником належить африканська чума свиней?

1. вірози
2. бактеріози
3. рикетсіози
4. мікози
5. мікоплазмози
6. хламідіози

21. Які тварини сприйнятливі до збудника АЧС?

1. свині
2. коні
3. корови
4. хижі тварини із родини котячих
5. вівці

22. Назвіть можливі шляхи зараження тварин збудником АЧС

1. аліментарний
2. аерогенний

3. трансоваріальний

23. Назвіть резервуар збудника хвороби в стаціонарно неблагополучних з АЧС країнах

1. мишоподібні гризуни
2. аргасові кліщі
3. вольфартові мухи
4. птиця з ряду страусоподібних
5. кажани і вампіри

24. Яка тривалість інкубаційного періоду при АЧС?

1. від 2 до 20 днів
2. до 40 днів
3. від 20 до 90 днів
4. до 6 місяців

25. Які системи організму найбільш часто уражаються при АЧС?

1. кровотворна
2. нервова
3. серцево-судинна
4. харчотравна
5. лімфатична
6. опорно-рухова

26. Назвіть можливі форми перебігу АЧС у тварин

1. гостра
2. хронічна
3. латентна
4. блискавична

27. Який середньостатистичний показник летальності серед тварин в свіжих вогнищах АЧС?

1. до 10%
2. від 10 до 20%
3. від 20 до 40%
4. від 40 до 60%
5. від 60 до 90%
6. від 90 до 100%

28. Які патзміни можна вважати типовими для АЧС?

1. геморагічний діатез і ураження лімфоїдних тканин
2. ураження нервової системи
3. дифтеритичне запалення кишечника
4. різке зменшення розміру селезінки

29. Що роблять із хворими АЧС тваринами в Україні?

1. тварин ізолюють і лікують антибіотиками
2. ізолюють і потім здають на забій на найближчий м'ясокомбінат
3. тварин лікують симптоматичними засобами
4. лікування заборонене, тварин забивають безкровним методом, а туші спалюють

30. Що рекомендовано робити із м'ясом вимушено забитих тварин при АЧС в Україні?

1. використовують без обмежень
2. використовують на варені ковбаси або консерви
3. використовують після заморожування до -20°C
4. туші спалюють

31. Як використовують туші і продукти забою свиней, отримані у загрозовій щодо АЧС зоні?

1. використовують без обмежень
2. використовують на варені ковбаси або консерви
3. використовують після заморожування до -20°C
4. туші спалюють

32. Що лежить в основі профілактики АЧС в Україні?

1. запобігання заносу збудника в країну
2. вакцинопрофілактика
3. ізоляція вирощування тварин різноманітних вікових груп
4. регулярне серологічне дослідження свиней на наявність вірусоносіїв

33. Чи існує специфічна профілактика АЧС?

1. існує за допомогою живих вакцин
2. існує за допомогою інактивованих вакцин
3. існує за допомогою гіперімунних сироваток
4. специфічна профілактика не розроблена

34. Через який період часу після знищення всіх свиней у вогнищі АЧС і забою у загрозовій зоні з господарства знімають карантин?

1. через 14 днів
2. через 21 день
3. через 30 днів
4. через 45 днів

Вірусний гастроентерит свиней

35. До якої родини вірусів належить збудник ТГС?

1. Picornaviridae
2. Coronaviridae
3. Retroviridae
4. Poxviridae

36. У організмі яких видів тварин можна спостерігати репродукцію вірусу ТГС?

1. собаки
2. вівці
3. коні
4. кози

37. Назвіть можливі шляхи зараження тварин при ТГС

1. аліментарний
2. аерогенний

3. трансоваріальний
 4. трансмісивний
38. Чи має місце вірусоносійство після перехворювання тварин ТГС?
1. вірусоносійство не спостерігається
 2. вірусоносійство практично довічне
 3. вірусоносійство може продовжуватися 2-3 міс. після перехворювання
 4. вірусоносійство може продовжуватися від 1 до 2 років після перехворювання
39. Де відбувається первинна репродукція вірусу ТГС при потраплянні його в організм тварини?
1. в епітеліальних клітинах ротової порожнини
 2. в епітеліальних клітинах прямої кишки
 3. в епітеліальних клітинах голодної кишки
 4. у печінці
 5. у кровотворних органах
40. Чи можна виділити вірус ТГС із крові інфікованої тварини?
1. не можна
 2. можна тільки у свіжих вогнищах хвороби
 3. можна через 12 годин після зараження
 4. можна тільки в дорослих тварин
41. Яка середня тривалість інкубаційного періоду при ТГС?
1. 1-3 дні
 2. 7-10 днів
 3. 2-3 тижні
 4. 1-2 місяці
42. Яка вікова група тварин найбільше сприйнятлива до збудника ТГС?
1. поросята-сисуні
 2. поросята віком 1-2 міс.
 3. підсвинки віком 3-4 міс.
 4. дорослі свиноматки
 5. кнури-плідники
43. Які серологічні реакції використовують для ідентифікації вірусу ТГС?
1. 1РДП
 2. 2РН
 3. 3РЗК
 4. 4РГА
 5. 5 РІД
44. Яка тривалість імунітету в перехворілих ТГС?
1. до 2 років
 2. довічний
 3. імунітет при перехворюванні ТГС не утворюється
45. Які лабораторні методи використовують для діагностики ТГС?
1. мікроскопія мазків-відбитків
 2. серодіагностика за допомогою РН

3. посів на штучних живильних середовищах
 4. постановка РІФ
46. Що роблять із хворими ТГС тваринами?
1. ізолюють, а потім забивають на м'ясо
 2. тварин забивають, а туші спалюють
 3. ізолюють і лікують симптоматичними засобами антибіотикотерапія
 4. усіх негайно вакцинують
47. Що роблять із тушами отриманими при забої хворих ТГС тварин?
1. внутрішні органи утилізують, а м'ясо використовують без обмежень
 2. туші разом із шкірою і внутрішніми органами утилізують
 3. м'ясо на копченості, а внутрішні органи на промпереробку
 4. м'ясо разом із внутрішніми органами використовують на варені
 5. ковбаси або консерви
48. Через який час після останнього випадку загибелі або видужання тварин знімають обмеження з неблагополучного щодо ТГС господарства?
1. через 20 днів
 2. через 1 місяць
 3. через 2 місяці
 4. через 3 місяці
 5. через 4 місяці

Бешиха свиней

49. До якої групи хвороб за збудником належить бешиха свиней?
1. рикетсіози
 2. хламідіози
 3. бактеріози
 4. вірози
 5. мікози
50. Чи може збудник бешихи свиней утворювати капсули?
1. може
 2. не може
 3. можуть окремі штами
51. Який антигенний тип збудника бешихи свиней найчастіше викликає хворобу?
1. А-тип
 2. В-тип
 3. N-тип
52. У якому віці свині частіше хворіють бешихою?
1. 1-2 тижні
 2. 2-4 тижні
 3. 1-2 місяці
 4. 3-12 місяців
53. Серед яких видів тварин зустрічається мікробоносійство при бешисі
1. гризуни
 2. кози

3. птиця
 4. вівці
54. У який період року найбільш часто зустрічається захворювання свиней на бешиху?
1. зимою
 2. навесні
 3. влітку
 4. восени
55. Назвіть основний шлях зараження свиней збудником бешихи?
1. аліментарний
 2. аерогенний
 3. контактний
 4. трансмісивний
56. Яка середня тривалість інкубаційного періоду при бешихі свиней?
1. 2-5 днів
 2. 1-2 тижні
 3. від 2 тижнів до 1 місяця
 4. не вивчений
57. Яких лабораторних тварини можна використовувати для біопроби при бешихі свиней?
1. кролів
 2. білих мишей
 3. морських свинок
 4. голубів
58. Чи може людина хворіти на бешиху?
1. може
 2. не може
 3. може тільки при інфікуванні Т-типом збудника
59. Які форми клінічного перебігу бешихи існують у свиней?
1. септична
 2. легенева
 3. кишкова
 4. шкірна
 5. латентна
60. Чи існує специфічна профілактика бешихи свиней у країнах СНД?
1. не існує
 2. існує за допомогою гіперімунних сироваток
 3. існує вакцина ЛТ-1
 4. існує вакцина КСУ-1
 5. існує вакцина ВР-2
61. Що роблять із хворими на бешиху тваринами?
1. ізолюють, а потім забивають на м'ясо
 2. тварин забивають, а туші спалюють
 3. ізолюють і лікують антибіотиками і гіперімунною сироваткою
 4. вводять вакцину в подвійній дозі

62. Що роблять із тушами при забої хворих на бешиху тварин?

1. внутрішні органи утилізують, а м'ясо використовують без обмежень
2. туші разом із шкірою і внутрішніми органами утилізують
3. м'ясо на копченості, а внутрішні органи на промпереробку
4. м'ясо разом із внутрішніми органами використовують на варені ковбаси або консерви

Гемофільозний полісерозит

63. До якої групи хвороб за збудником належить гемофільозний полісерозит?

1. рикесіози
2. хламідіози
3. бактеріози
4. вірози
5. мікози
6. спірохетози

64. Назвіть основні патологоанатомічні ознаки гемофільозного полісерозиту?

1. набряки голови
2. серозно-фібринозний плеврит та перикардит
3. інфаркти на селезінці
4. фібринозне запалення очеревини
5. драглистий інфільтрат на ободовій кишці

65. Чи може збудник гемофільозного полісерозиту утворювати капсули?

1. може
2. не може
3. можуть окремі штами
4. немає правильної відповіді

66. Назвіть основний шлях зараження збудником гемофільозного полісерозиту?

1. аліментарний
2. аерогенний
3. контактний
4. трансмісивний

67. Який патматеріал направляють у лабораторію при підозрі на гемофільозний полісерозит?

1. нирки
2. шматочки селезінки
3. лімфовузли
4. екссудат черевної, плевральної аб з перикар діальної порожнини
5. шматочки вражених легенів, печінка з жогчним міхуром

68. У який період свого життя тварини частіш хворіють на гемофільозний полісерозит?

1. за 5-7 днів до відлучення
2. під час відлучення
3. через 8-14 днів після відлучення
4. у віці від 4-х до 8 місяців

69. Як: групи лікарських речовин можна ві [користон увати для лікування хворих на гемофільозний полісерозит тпарин,?

1. проносні
2. в'яжучі
3. антибіотики
4. сечогінні
5. відхаркувальні
6. лікування заборонене

70. Які препараті існують для специфічно¹ профілактики гемофільозного полісерозиту?

1. жива вакцина
2. гіперімунна сироватка
3. інактивована вакцина
4. інтерферон

71. Які лабораторні методи використовують для діагностики гемофільозного полісерозиту?

1. мікроскопія мазків-відбитків
2. серодіагностика за допомогою РІ і
3. посів на штучні живильні середовища
4. постановка РІФ
5. біопроба на кролях

72. На яких живильних середовищах культивують збудник гемофільозного полісерозиту?

1. МЛА, МПБ
2. середовище Сабуро
3. сироватко-дріжжові середовища
4. шоколадний агар з "бакгодівницею"

73. Яку характерну позу займають хворі на гемофільозний полісерозит тварини?

1. поза „пінгвіна"
2. поза „сидячої собаки"
3. поза „лежачого коня"
4. страусина поза

Ензоотичний енцефаломієліт

74. Які інші назви хвороби ензоотичний енцефаломієліт Ви знаєте?

1. везикулярна хвороба
2. хвороба Тальфана
3. тешенська хвороба
4. хвороба Монтгомері
5. мальтійська лихоманка

75. До якої групи хвороб за збудником належить ензоотичний енцефаломієліт?

1. бактеріози
2. вірози

3. хламідіози
4. рикетсіози
5. мікози

76. Які вікові групи тварин найбільш сприятливі до збуднику ензоотичного енцефаломієліту?

1. новонароджені поросята
2. поросята-сисуни
3. свині віком 2-10 міс
4. дорослі свині
5. ремонтні свиноматки

77. Назвіть можливі джерела збудника ензоотичного енцефаломієліту

1. комахи
2. гризуни
3. хворі тварини
4. перехворілі тварини

78. Які ознаки є характерними для хворих на ензоотичний енцефаломієліт тварин?

1. підвищення температури
2. енцефаліт
3. ентероколіт
4. енцефаломієліт
5. риніт
6. гастрит
7. профузний пронос

79. Назвіть середньостатистичний відсоток летальності серед хворих на ензоотичний енцефаломієліт тварин

1. до 10%
2. від 10 до 30%
3. від 30 до 90%
4. практично 100%

80. Яка тривалість вірусоносійства після перехворювання тварини на ензоотичний енцефаломієліт?

1. рік
2. 2-5 років
3. все життя
4. вірусоносійство не спостерігається

81. Назвіть основний шлях передачі збудника ензоотичного енцефаломієліту;

1. аліментарний
2. аерогенний
3. трансмісивний
4. трансоваріальний

82. В яких органах найбільш виразна патогенна дія збудника ензоотичного енцефаломієліту?

1. головний мозок
2. спинний мозок

3. печінка
4. селезінка
5. нирки
6. легені

83. Які препарати можна використовувати для лікування тварин хворих на ензоотичний енцефаломієліт?

1. антибіотики
2. специфічні сироватки
3. нейролептики
4. енцефарм
5. лікування не розроблено
6. лікування заборонене

84. Назвіть тривалість інкубаційного періоду при ензоотичному енцефаломієліті

1. до 10 годин
2. від 10 до 30годин
3. від 2 до 7 днів
4. від 8 до 30 днів
5. від 1 до 3 місяці!

85. Від яких хвороб потрібно диференціювати ензоотичний енцефаломієліт?

1. пастерельоз
2. 2АЧС
3. хвороба Ауєскі
4. бешиха
5. інфекційний атрзфічний риніт

86. Чи існує специфічна профілактика ензоотичного енцефаломієліту в Україні?

1. не існує
2. існує за допомогою гіперімунних сироваток
3. існує за допомогою ряду вакцинних препаратів

Дизентерія свиней

87. До якої групи хвороб за збудником належить дизентерія свиней?

1. рикетсіози
2. бактеріози
3. вірози
4. хламідіози
5. спірохетози

88. Які види тварин є сприйнятливими до збудника "дизентерії" свиней?

1. вівці
2. 2ВРХ
3. свині
4. кози
5. коні

89. Назвіть найбільш ймовірне джерело збудника дизентерії свиней
1. щурі
 2. дикі голуби
 3. хворі на дизентерію свині
 4. кози як природний резервуар збудника хвороби
90. Назвіть пори року, коли дизентерію свиней реєструють найчастіше?
1. весною
 2. літом
 3. осінню
 4. зимою
91. Назвіть відомі шляхи зараження збудником дизентерії свиней
1. аерогенний
 2. аліментарний
 3. трансмісивний
 4. трансоваріальний
 5. через пошкоджену шкіру
92. Назвіть одну вікову групу тварин, яка найчастіше хворіє на дизентерію?
1. поросята-сисуні
 2. поросята у віці від 1 до 6 місяців
 3. дорослі свині старше 1 року
 4. разові свиноматки
93. Яка середньостатистична тривалість інкубаційного періоду при дизентерії свиней?
1. 6-12 годин
 2. 12-24 годин
 3. від 2 днів до 3 місяців
 4. від 3 до 6 місяців
94. Які процеси відбуваються в організм: тварини під впливом збудника дизентерії свиней?
1. катаральне запалення шлунку
 2. гнійно-некротичне запалення вгріхніх дихальних шляхів
 3. дифтерично-геморагічний колі г
 4. діарея, калові маси з домішками слизу і крові
 5. запалення оболонок головного мозку
95. Назвіть основну клінічну ознаку дизентерії свиней у хворих тварин?
1. висока температура
 2. гематурія
 3. діарея, калові маси з домішкам ;і слизу і крові
 4. судоми
 5. парез кінцівок
96. Де локалізується збудник дизентерії свиней в організмі хворих тварин?
1. в жовчних ходах печінки
 2. на слизовій глотки і язика
 3. на слизовій оболонці товстого сишечнику
 4. в гангліях нервових клітин

97. Назвіть можливі форми перебігу дизентерії свиней

1. блискавична
2. гостра
3. підгостра
4. хронічна

98. Назвіть основний шлях виділення збудника із організму хворих на дизентерію свиней

1. з сечею
2. з бронхіальним слизом
3. з слиною
4. з фекаліями
5. з навколоплідними водами

99. В яких органах хворих на дизентерію свиней тварин відзначають характерні для хвороби патзміни?

1. в легенях
2. в головному мозку
3. в шлунку
4. в кишечнику

100. Від яких хвороб потрібно диференціювати дизентерію свиней?

1. ІКЧС
2. бешихи
3. ЗТГС
4. сальмонельозу
5. кормових токсикозів

101. Які із перерахованих препаратів застосовують для лікування хворих на дизентерію свиней?

1. осарсол
2. фармазин
3. лазолван
4. тривіт
5. лікування заборонено

102. Яка тривалість імунітету у свиней, які перехворіли на дизентерію?

1. до 1 року
2. імунітет довічний
3. імунітет не утворюється

103. В якому віці поросят вакцинують проти дизентерії свиней?

1. з 2-3 денного віку
2. з 2-3 місячного віку
3. вакцинують тільки супоросних свиноматок
4. вакцинація не розроблена

104. Які заходи проводять в господарстві при виникненні дизентерії свиней?

1. клінічно здорових тварин вакцинують
2. хворих тварин ізолюють і лікують
3. тяжко хворих тварин відправляють на забій
4. хворих тварин забивають, а туші спалюють

Інфекційний атрофічний риніт

105. Назвіть збудника інфекційного атрофічного риніту.
 1. Mycoplasma suis
 2. Streptococcus suis
 3. Pasterella multocida
 4. Plamidiae psitaci
 5. Bordetella bronchiseptica
106. Який вид тварин в природних умовах хворіє на інфекційний атрофічний риніт?
 1. свині
 2. вівці
 3. велика рогата худоба
 4. собаки
 5. коні
 6. птахи
107. Назвіть основний шлях передачі збудника інфекційного атрофічного риніту
 1. аерогенно
 2. через ґрунт
 3. через пошкоджену шкіру
 4. трансмісивно
 5. трансоваріально
108. Назвіть можливі джерела збудника інфекційного атрофічного риніту
 1. хворі на ІАР свині
 2. свині, які є бордетелоносіями
 3. кролі, які є бордетелоносіями
 4. птиця старше року
109. Через скільки років після появи в господарстві епізоотичний процес при ІАР набуває свого піку?
 1. Через 1 рік
 2. через 2 роки
 3. 2-4 роки
110. Назвіть характерні клінічні симптоми інфекційного атрофічного риніту в свиней.
 1. катаральний риніт
 2. діарея з домішками крові
 3. неправильний прЕ кус
 4. криворилість
 5. мопсовидність
 6. манежні рухи
111. Назвіть основні методи діагностики інфекційного атрофічного риніту в свиней.
 1. епізоотологічний
 2. клінічний
 3. патологоанатомічний

4. біопроба на каченятах до 20-денного віку
 5. гематологічний
 6. серологічний
112. Які заходи проводять в неблагополучному щодо ІАР господарстві?
1. клінічний огляд всього поголів'я свиней один раз в 5-6 днів і
 2. ізоляція хворих
 3. хворих ізолюють, відгодовують і здають на забій
 4. хворих ізолюють, забивають, а туші спалюють
 5. вакцинація всіх підозрілих в зараженні тварин

Ключ
Для визначення правильності відповідей
на тестові завдання за теоретичним матеріалом модулю
“Інфекційні хвороби свиней”

№ питання	Вірні відповіді	№ питання	Вірні відповіді	№ питання	Вірні відповіді	№ питання	Вірні відповіді
1	1,2	35	2	69	3	103	4
2	1,4	36	1	70	2,3	104	2,3
3	4	37	1,2	71	1,3	105	5
4	2	38	3	72	3,4	106	1
5	1	39	3	73	2	107	1
6	5	40	3	74	3	108	1,2,3
7	1,2	41	1	75	2	109	3
8	1	42	1	76	3	110	1,3,4,5
9	1,2,4	43	2	77	3,4	111	1,2,3
10	1,4	44	1	78	2,4	112	1,2
11	1,4	45	2,5	79	3		
12	1,4	46	3	80	1		
13	3,4	47	4	81	1		
14	6	48	4	82	1,2		
15	1	49	3	83	4		
16	4	50	2	84	4		
17	1	51	1	85	3		
18	4	52	4	86	3		
19	2	53	1,3	87	5		
20	1	54	3	88	3		
21	1	55	1	89	3		
22	1,2	56	1	90	3,4		
23	2	57	2,4	91	2		
24	1	58	1	92	2		
25	1,5	59	1,4,5	93	3		
26	1,2,3	60	2,5	94	3,4		
27	6	61	3	95	3		
28	1	62	4	96	3		
29	4	63	3	97	2,3,4		
30	4	64	2,4	98	4		
31	2	65	1	99	4		
32	1	66	2	100	3,4,5		
33	4	67	4	101	1,2		
34	3	68	3	102	3		

Література

1. Горбань М.І. Епізоотологія/М.І. Горбань. – 3 вид. перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1989. – 309с.
2. Домбровська О.Б. Контроль знань та умінь студентів/О.Б.Домбровська // Наука і техніка.- 2004.-№ 2.-с.156- 168 .
3. Епізоотологія з мікробіологією: підручник /Г.В. Козловська, Л.Є. Корнієнко, М.Г. Наконечна та ін; За ред В.П.Постоя. – К.: Вища освіта, 2006. – 543 с.
4. Жукова Л.Б. Методичне забезпечення поточного контролю знань студентів/Л.Б. Жукова // Організація навчально-виховного процесу.- 2006. - №7. с.197– 205 .
5. Карішева А.Д. Спеціальна епізоотологія: підручник/А.Д. Карішева. – К.: Вища освіта, 2002. – 703 с.
6. Матієнко В.М. Тестовий контроль, його можливості, місце в навчальній роботі та умови ефективного впровадження/В.М. Матієнко , П.П. Тонкоглас // Організація навчально-виховного процесу.-Навчально-методичний центр, 2006. - №5. – с. 7-10.
7. Положення про модульно - рейтингові принципи навчання та контролю знань студентів. - К.: НАУ, 1994. – 56 с.
8. Решетник П.М. Застосування технології навчання в сільськогосподарських навчальних закладах/П.М.Решетник // Сучасні педагогічні технології у вищій школі.- 1995. - № 1. – с. 13 - 15.
9. Теорія професійної підготовки спеціалістів (загальна методика): методичний посібник для викладачів вищих аграрних навчальних закладів, слухачів педагогічного факультету, магістрів.- К.: Видавничий центр НАУ, 2003. – 243 с.