

СТЕФАНОФІЛЯРІОЗ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Стефанофіляріоз — нематодозне захворювання великої рогатої худоби, яке характеризується ураженням шкіри в ділянці вим'я, черевної стінки, лопаток. Проміжний хазяїн стефанофілярій — кровосисні мухи-жигалки, які особливо полюбують кров корів на пасовищі. Раніше вважали, що дане захворювання зустрічається переважно на півдні України, однак у зв'язку зі значною міграцією тварин стефанофіляріоз наразі спостерігається і на Чернігівщині. З кожним роком виявляємо все більше хворих стефанофіляріозом тварин. А тому хочеться розповісти про один цікавий випадок.

У ветеринарну клініку Козелецького технікуму ветмедицини БНАУ звернулися за допомогою власники корови. У тварини на шкірі вим'я з'явилися припухлості, вкриті струпами, шкіра стала грубою, почала тріскатися і кровоточити. Особливо сильно уражена шкіра діжок. На уражені ділянки злітаються мухи і мошки. Господиня поскаржилася, що корову неможливо видоїти — тварина непокоїться, б'ється ногами. Цікаво, що такі симптоми спостерігалися



Флуєрар Н.І. на практичному занятті з паразитології зі студентами 4-А курсу

у корови не лише влітку, а й у стійлово-прив'язний період року. До того як звернутися до нас власники тварини вже використали цілий арсенал ліків проти корости, грибкових захворювань, але змін на краще не спостерігалось.

При клінічному огляді тварини та за результатами лабораторного дослідження ми діагностували стефанофіляріоз. Корові вводили підшкірно 10% левамизол в дозі 7,5 мл/100 кг маси тіла дві доби

підряд. Власникам рекомендували не використовувати молоко в їжу протягом двох діб.

Звичайно, якби корова не була в стадії лактації, то можна було б використати більш ефективні препарати — дектомакс, нововерм, бровермектин, які є в кожній ветаптеці. Але при їх застосуванні період каренції значно довший.

Також порадили двічі на добу змащувати уражені місця офтальмо-гелем. А щоб корова знову не стала дефінітивним хазяїном для стефанофілярій і легкою здобиччю для мух і гнусу, рекомендували наносити на шкіру вздовж хребта один раз на 4–6 тижнів байофлай пур-он або ж застосовувати інсекто-акарицидну пудру по 100–200 г на тварину. Обидва ветпрепарати можна застосовувати для дійних корів.

Наша пацієнтка-корова видужала, а для нас зі студентами це був ще один день цікавої практики. **Зт**

ЩО РАДЯТЬ ПАРАЗИТОЛОГИ

Після укусу мухи-жалиці

Стефанофіляріоз — захворювання шкіри, що викликається дрібним гельмінтом та його личинками, які паразитують у товщі шкіри великої рогатої худоби. Найчастіше на тих частинах тіла, де вона найтонша, найеластичніша, скажімо, на вимені, вушній раковині, нижній частині тулуба. Спричиняють хворобу мухи-жалиці, зокрема, жалиця осіння. Вони є переносниками личинок цього гельмінта. Масово вилітають жалиці в другій половині літа і на початку осені. Розмножуються в низинних і заболочених місцях.

Проявляється стефанофіляріоз раптово у будь-яку пору року. На нижній стінці живота худоби з'являються залисини, невеликі припухлості, вкриті струпами, а то й так звані «літні рани» на вимені корів, які фахівці нерідко сприймають за віспу.

Лікування комплексне: системний протипаразитарний препарат (івомек, дектомакс, цидектін), зовнішньо — хлорофос, бутокс, для обробки рани — йодогліцерин, стрептоцидова або стрептоміцинова мазі, бактерицидні засоби, що містять оксикорд, преднізолон.

АВТОР

Флуєрар Н.І.,
викладач Козелецького технікуму
ветеринарної медицини БНАУ